


Guia de Indicação para ECMO em COVID-19

Sim



Tratar a causa da SARA Estratégia de ventilação de proteção pulmonar Diurese ou Ressuscitação conforme apropriado



Pao2/FiO2<150 mmHg

Posição prona

Recomendado

Bloqueio Neuromuscular Estratégias de Peep alta

Considerar

Vasodilatadores pulmonar inalatórios Manobras de Recrutamento

Manter tratamento atual

Não

Manter tratamento atual

Alguns dos seguintes critérios foram atendidos:

Pao2/FiO2<80 mmHg por > 6hrs Pao2/FiO2<50 mmHg por > 3hrs Se ph <7,25 com PCo2>60 mmHg por mais

de 6 hrs

Não

Traduzido por : Gabriela Barcellos de Bakker (Mestranda do programa de Pós graduação da EEAN) Revisado por Damaris Vieira Braga, Andrea Barroso Benevides e Juliana Faria Campos

Fonte: Elso Guidance Document: Use of ECMO in COVID-19 Patients During the Pandemic

Contraindicações para ECMO? Sim

Sim

Não

ECMO INDICADO

Pao2/FiO2≥150 mmHg

por mais de 6 hrs?

Se ph <7,25 com PCo2>60 mmHg

Considerar tratamento adjuvante